

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986-

תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא / י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה:

רנג'ל טבליות 800 מ"ג

הרכב: כל טבליה מכילה Sevelamer Hydrochloride 800 mg

מרכיבים בלתי פעילים: diacetylated monoglyceride, colloidal silicon dioxide, hydroxypropyl methylcellulose, stearic acid.

פעילות רפואית:

הורדת רמת הזרחן בדם בחולים עם אי ספיקה כלייתית.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לסבלאמר או לאחד ממרכיבי התרופה. אין להשתמש אם הינך סובל/ת מתת רמה של זרחן בדם או מחסימת מעיים..

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול: אם הינך בהריון או מניקה.

אזהרות:

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם לרמות סידן, כלוריד, ביקרבונאט, זרחן. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. יש לנקוט בזהירות אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מהפרעות בתיפקוד מערכת העיכול, כגון קשיים בבליעה, בעיות קשות בתנועתיות המעיים, כולל עצירות קשה, אם עברת ניתוח רחב היקף במערכת העכול.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. סמוך לנטילת רנג'ל מומלץ שלא ליטול תרופות אשר שינוי בריכוזן בדם עשוי להשפיע על פעילותן. מומלץ ליטול תרופות שכאלו כשעה לפני או שלוש שעות לאחר נטילת רנג'ל. בעת הטיפול ברנג'ל יש לנקוט בזהירות בנטילת תרופות נוגדות פרוקסטים ותרופות המשפיעות על קצב הלב. נמצא כי רנג'ל מפחית בכ 50% את ספיגת התרופה האנטיביוטית ציפרופלוקסאצין.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי שונות, ביניהן: בחילה, הקאה, עצירות, שילשול, גאזים והפרעות עיכול, עליה בלחץ הדם, כאבי ראש, גרד.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא.

מינון:

מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. לא הוכחה יעילות ובטיחות התרופה בילדים.

אופן השימוש:

יש ליטול התרופה עם ארוחה. מכיוון שתכולת התכשיר רנג'ל מתפשטת/ מתרחבת במים, יש לבלוע את הטבליות בשלמותן - אין ללעוס, לרסק, לשבור או לפרק את התכשיר לפני נטילתו.

מנע הרעלה !

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא !

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך ; לחולה אחר/ת, היא עלולה להזיק. **אל תיתן תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.**

אין ליטול תרופות בחושך : בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכבי משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה :

במקום יבש. סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר ! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום רנג'ל 800 מ"ג : 124.23.30319.00

היבואן ובעל הרישום : ג'נזיים ישראל בע"מ כתובת : ת.ד. 1188, כפר-סבא 44111

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר.